

抗精神病薬の副作用

薬剤師 四方 佳美

●副作用とは？

- 治療の目的とする作用以外の全ての作用
- 副作用がゼロの薬はない
- 副作用＝毒性 ではない！
- 飲めば必ず現れるものではない
- 対処法がある

副作用は心配ですね…。

でも、こわがりすぎない

●主な抗精神病薬

内服薬

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> リスパダール、リスペリドン | <input type="checkbox"/> シクレスト |
| <input type="checkbox"/> シプレキサ、オランザピン | <input type="checkbox"/> クロザリル |
| <input type="checkbox"/> セロクエル、クエチアピン | <input type="checkbox"/> セレネース、ハロペリドール |
| <input type="checkbox"/> ルーラン | <input type="checkbox"/> ロドピン、ロシゾピロン |
| <input type="checkbox"/> エビリファイ | <input type="checkbox"/> ウインタミン、コントミン |
| <input type="checkbox"/> ロナセン | <input type="checkbox"/> ヒルナミン、レボメプロマジン |
| <input type="checkbox"/> インヴェガ | |



注射薬（作用が2週間または4週間続く薬）

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ハロマンズ | <input type="checkbox"/> ゼプリオン |
| <input type="checkbox"/> リスパダールコンスタ | <input type="checkbox"/> エビリファイ |

●主な副作用

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 手指がふるえる | <input type="checkbox"/> 便秘 |
| <input type="checkbox"/> よだれが出る | <input type="checkbox"/> 尿が出にくい |
| <input type="checkbox"/> ろれつが回りにくい | <input type="checkbox"/> 目がみえにくい |
| <input type="checkbox"/> 体がムズムズ、そわそわする | <input type="checkbox"/> 立ちくらみ |
| <input type="checkbox"/> 体がこわばる | <input type="checkbox"/> 体重増加 |
| <input type="checkbox"/> 黒目が上を向いてしまう | <input type="checkbox"/> 生理不順 |
| <input type="checkbox"/> 眠気 | <input type="checkbox"/> 乳汁が出る |
| <input type="checkbox"/> 口が渇く | <input type="checkbox"/> 性行為の機能が悪くなる |



●副作用の伝えかた（主治医に伝えるポイント）

- ①**期間**（いつから） 例：1週間前から
- ②**程度**（どのくらい辛い症状か） 例：黒目が勝手に上を向いて我慢できない
- ③**頻度**（どのくらい起こるか） 例：1日に1回くらい

